

I. Qu'est ce qu'un schéma de Bernoulli ? une loi binomiale ?


- Définitions
- ⊠ Une **épreuve de Bernoulli** est une expérience aléatoire à deux issues.
 - ⊠ On appelle **succès** (S) l'une de ces deux issues et **échec** l'autre issue (\overline{S}).
 - ⊠ On appelle **paramètre** et on note p la probabilité d'obtenir le succès : $p = p(S)$.
Par ailleurs, on note parfois q la probabilité d'obtenir l'échec : $q = p(\overline{S}) = 1 - p$.
 - ⊠ L'expérience aléatoire consistant à répéter n fois de manière indépendante une même épreuve de Bernoulli de paramètre p s'appelle un **schéma de Bernoulli** de paramètres n et p .
 - ⊠ La loi de probabilité de la variable aléatoire X comptant le nombre de succès obtenus dans un tel schéma de Bernoulli est appelée **loi binomiale** de paramètres n et p et est notée $\mathcal{B}(n ; p)$

Exemple Considérons les deux expériences aléatoires suivantes :

Expérience n°1 On lance 8 fois une pièce de monnaie truquée telle que la probabilité d'obtenir face soit 0,3. Notons F la variable aléatoire comptant le nombre de fois où l'on obtient face.

Expérience n°2 On effectue 8 tirages avec remise dans une urne contenant 3 boules blanches et 7 boules noires. Notons R la variable aléatoire égale au nombre de boules rouges tirées.

Ces deux expériences correspondent à une répétition de 8 épreuves de Bernoulli de probabilité 0,3 (identiques et indépendantes). Elles peuvent être modélisées par un même schéma de Bernoulli selon l'arbre suivant :



Ces deux expériences correspondent ainsi à un même schéma de Bernoulli et les variables aléatoires F et R suivent en fait la même loi de probabilité, la loi binomiale $\mathcal{B}(8 ; 0,3)$.

Contre-exemple

Si, dans l'expérience n°2 ci-dessus, il n'y avait pas eu remise entre chaque tirage, les expériences successives n'auraient pas été indépendantes (fonction du tirage précédent) et non identiques (répartition des boules différentes à chaque tirage).

Une telle situation ne correspond pas à un schéma de Bernoulli.

II. Etude de l'arbre de probabilité d'un schéma de Bernoulli : coefficients binomiaux

Considérons un schéma de Bernoulli de paramètres n et p et un entier naturel k tel que $0 \leq k \leq n$.

L'analyse Sur l'arbre de probabilité correspondant, si un chemin comporte k succès (de probabilité p), alors il comporte $n - k$ échecs de probabilité $q = 1 - p$.

D'après le principe multiplicatif, la probabilité d'un tel chemin est : $p^k \times q^{n-k} = p^k \times (1-p)^{n-k}$.

Autrement dit, chaque chemin comportant k succès a une même probabilité, et donc, étudier un schéma de Bernoulli revient en fait à déterminer le nombre de chemins ayant k succès.

Définition On appelle **coefficient binomial** le nombre de chemins dans l'arbre pondéré réalisant k succès pour n répétitions. Ce nombre se note $\binom{n}{k}$ et se lit « k parmi n ».

Remarques Par convention : $\binom{0}{0} = 1$ et, pour tout entier naturel n , on a : $\binom{n}{0} = 1$; $\binom{n}{1} = n$; $\binom{n}{n} = 1$.

Symétrie des coefficients binomiaux Pour $0 \leq k \leq n$, on a : $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.

preuve : Ce résultat est en fait une conséquence immédiate du fait que, dans un schéma de Bernoulli, il y a autant de chemins réalisant k succès que de chemins réalisant k échecs, c'est-à-dire $n - k$ échecs...

La formule de Pascal Pour $0 \leq k \leq n - 1$, on a : $\binom{n+1}{k+1} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1}$.

preuve : Par définition, $\binom{n+1}{k+1}$ est le nombre de chemins comportant $k+1$ succès pour $n+1$ répétitions.

Ces chemins se décomposent en deux parties disjointes :

▫ ceux qui commencent par un succès : l'arbre représentant les épreuves suivantes est alors un arbre à n épreuves où il ne reste plus qu'à choisir k succès : il y a donc $\binom{n}{k}$ chemins de ce type.

▫ ceux qui commencent par un échec : l'arbre représentant les épreuves suivantes est alors un arbre à n épreuves où il faut encore choisir les $k+1$ succès : il y a donc $\binom{n}{k+1}$ chemins de ce type.

On en déduit, par somme du nombre de ces chemins possibles, la formule de Pascal.

Pour calculer des coefficients binomiaux

☞ Avec le triangle de Pascal : ci-contre.

☞ Avec votre calculatrice.
(dans le répertoire Math... voir livre + manuel selon modèles...);

$n \backslash k$	0	1	2	3	4	5
0	1					
1	1	1				
2	1	2	1			
3	1	3	3	1		
4	1	4	6	4	1	
5	1	5	10	10	5	1

EXERCICE TYPE 1 Calculer des coefficients binomiaux

✓ Avec les propriétés : $\binom{17}{0} = 1$; $\binom{12}{11} = \binom{12}{12-11} = \binom{12}{1} = 12$; $\binom{45}{45} = 1$.

✓ Avec le triangle de Pascal : $\binom{4}{2} = 6$; $\binom{5}{3} = 10$.

✓ Avec la calculatrice : $\binom{9}{3} = 84$; $\binom{17}{5} = 6188$.

III. Etude de la loi binomiale : loi de probabilité, espérance et écart-type

Dans ce paragraphe, X désigne une variable aléatoire suivant une loi binomiale $\mathcal{B}(n ; p)$.
On considère un entier naturel k et on note $q = 1 - p$.

Théorème Pour $0 \leq k \leq n$, on a :
$$P(X = k) = \binom{n}{k} \times p^k \times q^{n-k} = \binom{n}{k} \times p^k \times (1-p)^{n-k}.$$

preuve : Par définition, il y a $\binom{n}{k}$ chemins menant à l'évènement $(X = k)$.

Et chacun d'eux comporte k succès (de probabilité p) et $n - k$ échecs de probabilité $q = 1 - p$, ce qui correspond, d'après le principe multiplicatif, à une probabilité $p^k \times q^{n-k} = p^k \times (1-p)^{n-k} \dots$

EXERCICE TYPE 2 *Calculer des probabilités pour une loi binomiale (calculatrice)*

Énoncé Une variable aléatoire X suit une loi binomiale $\mathcal{B}(10 ; 0,25)$.
A 10^{-2} près, déterminer $P(X = 3)$, puis en déduire $P(X \geq 4)$ et $P(4 \leq X \leq 10)$.

Solution ... à suivre prochainement...

EXERCICE TYPE 3 *Représenter par un diagramme en bâtons une loi binomiale*

Énoncé Une variable aléatoire X suit une loi binomiale $\mathcal{B}(4 ; 0,7)$.
1. Avec la calculatrice, déterminer la loi de probabilité de X .
2. Représenter graphiquement la loi de probabilité de X .

Solution ... à suivre prochainement...

Théorème (admis)
$$E(X) = np \quad ; \quad V(X) = npq = np(1 - p) \quad ; \quad \sigma(X) = \sqrt{npq} = \sqrt{np(1 - p)}$$

EXERCICE TYPE 4 *Calculer l'espérance et l'écart-type d'une loi binomiale*

Énoncé Une variable aléatoire X suit une loi binomiale $\mathcal{B}(4 ; 0,7)$.
1. Calculer l'espérance mathématique de X . Interpréter ce résultat.
2. Calculer l'écart-type de X .

Solution ... à suivre prochainement...